vée, et de fait elle est rectifiée dans les ouvrages récents de systématique, tel celui de Ganglbauer. Cependant je ne crois pas que ces organes aient jamais été figurés, et d'autre part un mémoire qui vient



Fig. 1. — Tarse de *Cnemidotus caesus* ♂, T : tibia ; I à V : art. du tarse ; P.a. : poils adhésifs.

Fig. 2. — Une ventouse isolée.

de paraître (Törne, in *Zool. Jahrbücher* [1910]) accepte encore sur ce point l'opinion de Simmermacher.

Le dessin ci-contre montre que chez *Cnemidotus caesus*, non seulement les organes adhésifs existent, mais qu'ils sont très développés et constitués par des ventouses de type asymétrique, de structure très rudimentaire, mais tout à fait typique. Il en est de même chez *Haliplus lineaticollis*, avec cette différence que le 3e article, au lieu de ne porter que quelques ventouses comme chez *Cnemidotus*, présente une brosse aussi développée que les deux précédents. Il n'est pas douteux pour moi que ces faits ne soient absolument généraux chez tous les Haliplides, et bien que je n'aie pas eu encore l'occasion de le vérifier, qu'ils ne se présentent aussi chez les *Pelobius*.

Description de trois Rhysodides nouveaux [Col.]

par A. Grouvelle.

Rhysodes longiceps, n. sp. — *Elongatus, oblongus, nitidus, fusco-castaneus. Antennae subincrassatae; articulis 2-3 transversis, 11º apice pulvinato, haud acuto. Caput elongatum, suboblongum; lobis posticis*

elongatis, basi subacuminatis, intus angulosis et inter se admotis, antice cum laterali margine junctis: spatio mediano inter posticos lobos producto, postice acuminato, antice attenuato et leviter impresso. Prothorax elongatus, subdepressus, capite latior, quadricostatus: costis internis depressis, externis subelevatis; sulcis externis basin versus latioribus; sulco mediano extremitatibus occluso. Elytra punctato-striata; intervallis convexis, quam striis latioribus, intervallo 4° ad apicem arcuato, pulvinato-elevato, cum suturali intervallo juncto. — Long. 7 mill.

Allongé, oblong, brillant, marron un peu foncé. Antennes médiocrement épaissies dans le milieu; articles 2-10 transversaux, 11ᵉ à peu près aussi long que large, terminé par un bouton subconique, émoussé au sommet. Tête plus longue que large, subparallèle; lobes postérieurs allongés, convexes, subacuminés à la base, anguleux et rapprochés en dedans, soudés en avant, près de la base des antennes, aux bourrelets marginaux de la tête; espace médian en forme de fer de lance assez large, acuminé en arrière, engagé entre les lobes postérieurs, jusqu'au niveau du bord antérieur des yeux, terminé en avant par un lobe allongé, subparallèle, impressionné à l'extrémité. Prothorax en ovale peu accentué, déprimé, environ une fois et un tiers aussi long que large, plus large que la tête, arrondi en avant, subtronqué à la base, chargé sur le disque de quatre côtes longitudinales : les internes déprimées, les externes subcostiformes; sillon interne rétréci au milieu, fermé aux extrémités ; sillons externes plus élargis à la base; sillons marginaux très étroits, visibles de dessus. Élytres oblongs, plus larges que le prothorax, profondément ponctués-striés; intervalles des stries aussi larges que les points, très convexes; 4ᵉ intervalle relevé vers le sommet en un fort bourrelet arqué en dedans, soudé à l'intervalle sutural et enfermant ainsi la cavité apicale de l'élytre.

Birmanie. — 1 individu (collection A. Grouvelle).

Voisin de *R. anguliceps* Arrow (cf. *Rev. d'Ent.*, XXII [1903], Synopsis des Rhysodides, tableau, p. 98); distinct par sa forme plus allongée et les angles postérieurs de la tête sans saillie anguleuse.

Rhysodes (Dhysores) quadriimpressus, n. sp. — *Elongatus, subparallelus, nitidus, nigro-piceus. Antennae subincrassatae; articulis 2 et 4-10 transversis, 3° subcordiformi. Caput subtriangulare, subconvexum, glabrum, lateribus marginatum: fronte in longitudinem breviter profundeque sulcata, sulco antice in duos sulcos breves, haud profundos, apice valde punctato-impressos diviso: utrinque ante antennarum basin*

impressione profunda. Prothorax oblongus, in longitudinem trisulcatus; sulco dorsali anticum marginem vix attingente, sulcis externis basilaribus, ultra medium attenuatis; lateribus prothoracis marginatis. Elytra punctato-striata; striarum intervallis punctis multo latioribus. — Long. 6-7 mill.

Espèce très voisine de *R. Thoreyi* Grouv. (cf. *Rev. d'Ent.*, XXII, [1903], p. 125) du Natal; distincte par la structure de la tête qui la rapproche des *Rhysodes* vrais. Le front présente un rudiment de sillon longitudinal se divisant, en avant, en deux faibles sillons divergents qui vont chacun rejoindre une forte impression ponctiforme, placée un peu avant la naissance de l'antenne. L'espace médian, limité en arrière par l'ensemble de ces deux sillons. se soude de chaque côté à la marge latérale de la tête, vers le niveau de la base des antennes et se termine en avant entre deux profondes impressions. Le *R. quadriimpressus* a les antennes plus épaisses que le *R. Thoreyi*; les sillons externes de son prothorax sont moins allongés et les lobes apicaux des tibias postérieurs du mâle moins développés. Les deux espèces ont les angles huméraux des élytres dentés.

Usambara : Nguelo. — 2 individus (collection A. Grouvelle).

Clinidium (Rhysodiastes) Waterhousei, n. sp. — *Elongatum, subparallelum, nitidum, atrum. Antennae moniliformes: articulis 2-10 transversis, subaequaliter latis, 11° oblongo, apice acuminato. Caput subtriangulare; lobis posticis intus parallelis, sulco profundo, antice bifurcato, separatis; spatio mediano lato, utrinque cum capitis laterali margine juncto, postice acuminato, antice constricto et utrinque sinuato. Prothorax oblongus, in longitudinem sulcatus, utrinque costatus; sulco haud latissimo, antice vix clauso; intervallis inter sulcum et costas basin versus et juxta costam impressis. Elytra in scutellari regione profunde impressa; singulo subaequaliter tricarinato: 1ª carina ante apicem evanescente, 2ª in apicali depressione terminata et antice juxta basin inflexa et pulvinata, 3ª ad apicem pulvinata.* — Long. 6 mill.

Allongé, subparallèle, brillant, noir. Antennes moniliformes. peu atténuées vers l'extrémité; articles 2-10 transversaux, 11ᵉ à peine plus long que large, oblong, acuminé à l'extrémité. Tête à peine plus longue que large au niveau des yeux, subtriangulaire; lobes frontaux séparés par un sillon longitudinal. à bords parallèles, bifurqué en avant en deux sillons courts, obliques, limités en avant par une jonction étroite de l'espace médian et des bords latéraux de la tête; espace médian en forme de fer de lance large. s'engageant par la pointe entre

les lobes frontaux, étroitement soudé de chaque côté aux bords latéraux de la tête, se rétrécissant brusquement au niveau de la naissance des antennes, alors sinué de chaque côté, subsinué à l'extrémité. Prothorax oblong, longitudinalement sillonné et bisubcaréné; sillon profond, assez large, émoussé sur les bords, presque fermé au sommet; élévations latérales subcariniformes, plus rapprochées de la marge latérale que du sillon médian, brusquement déclives du côté interne, progressivement infléchies du côté externe; bords latéraux étroitement rebordés; à la base, contre le bord interne de chaque élévation costiforme, une forte impression atteignant environ le quart de la longueur du prothorax. Élytres profondément enfoncés dans la région scutellaire, chacun longitudinalement tricaréné : 1re carène discoïdale plus accentuée en dedans qu'en dehors, s'arrêtant avant la dépression apicale de l'élytre; 2e en dessus de l'épaule, atteignant cette dépression, retournée en avant, contre la base, en forme de bourrelet; 3e humérale atteignant le bourrelet apical. De chaque côté des segments abdominaux une forte impression transversale.

Birmanie : mines de rubis. — I individu femelle (Doherty in collection du British Museum).

Vient se placer à côté du *C. Gestroi* Grouv. dans le tableau publié in *Rev. d'Ent.* XXII [1903], p. 104; se distingue plus particulièrement de cette espèce par ses lobes frontaux séparés par un sillon droit, et par l'espace médian de la tête en forme de fer de lance court, soudé étroitement aux marges latérales.

Description de deux Cétonides nouveaux [Col. Scarabaeidae]

par Gaston Seillière.

Glycyphana sericophora, n. sp. — *Nigra, elytris, scutello, pronoto capitisque vertice velutinis, glabris. Ornantur elytra quodque duabus marginalibus maculis, albo sericeis, quarum una, magna, discum elytri petit, et altera, multo minor, gibbum apicalem tegit : illarum macularum ambitus sat est undulatus. Corporis pars inferior et crura sunt nitida pilosque flavidos ferunt : lateribus sunt quaedam parvae maculae, albo-flavidae, pectore passim, abdomine ordinibus dispositae. Pygidium nigrum, immaculatum, levibus striolis vermiculatis dense*